

Folgende Medikamente sollten für den Krisenfall/Bedarfsfall verordnet werden:

verordnet:

Indikation	Medikament	Wirkstoff	Verabreichung	Dosierung	Intervall	HZ - HA
Starke Schmerzen/ Luftnot	Morphin 10mg/ml	Morphin	s. c.	0,5 Amp. (5mg) 1 Amp. (10mg)	Alle 4-6 Stunden	
Schmerzen / Fieber	Novalgin 1000mg	Metamizol	i. m. / s. c. oral /Zäpfchen	1 Ampulle 1x40° / 1x1 Tbl.	Alle 2-6 Stunden max. 4x40° / 4x2 Tbl.	
Unruhe / Schlafstö- rung Angst / Luftnot	Tavor Expedit 1,0 mg	Lorazepam	s. l.	1 Plättchen	max. 7,5 mg tägl.	
Übelkeit	Vomex 100mg	Dimenhydrinat	s. c. Zäpfchen	1 Ampulle 1x1	bis 3 x tägl. bis 3 x tägl.	
Sedierung	Midazolam 2mg/ml	Midazolam	s. c. / Nasal als Spray / bukkal	1 Ampulle	Nur nach Arzt- Rücksprache	

Weiter empfehlen wir nach Bedarf:

Dyspnoe	Bricanyl 0,5mg	Terbutalin	s. c	1 Ampulle	3 Ampullen tägl.	
Unruhe	Diazepam 10mg Diazepam	Diazepam	i. m. Tropfen	0,5 – 1 Ampulle 5-10 Tropfen	Alle 4-6 Stunden bis 3x tägl.	
Übelkeit / Erbrechen	Haloperidol	Haloperidol	s. c. Tropfen	0,5 Ampullen 1x 3 °	bis 3 x tägl. bis 4 x tägl.	
Obstipation	Laxoberal	Natriumpicosulfat	Tropfen	5 - 15 °	bis 3x tägl.	
Finales Rasseln / Krampfzustände	Buscopan 20mg	Butyscopolamin	s. c.	10 – 20 mg	bis 3 x tägl.	
Starke Ödeme	Furosemid 20 mg	Furosemid	i. v.	1 Ampulle	Nur mit Arzt!!!	
Hirnödem/Schocklunge	Dexaflam	Dexamethason	i. m. / i. v.	1 Ampulle	Nur nach Arzt – Rücksprache	

Bitte stellen sie auch ausreichend Material zur Verabreichung (Spritzen, Kanülen) bereit.